

東京湾における海域モニタリング結果(海底土)  
Readings of Sea Area Monitoring at Tokyo Bay (Marine Soil)

試料採取日: 平成25年8月21日  
(Sampling Date: Aug 21, 2013)

平成25年10月22日  
Oct 22, 2013  
原子力規制委員会  
Nuclear Regulation Authority (NRA)

海底土の放射能濃度  
Radioactivity concentration in marine soil

測定試料採取点 Sampling Point <sup>※1</sup>	採取日 Sampling Date	採取位置 Sampling Location		採取深度 Sampling Depth (m)	海底土の分類 <sup>※2</sup> Sediment Classification <sup>※2</sup>	放射能濃度(Bq / kg・乾土) Radioactivity Concentration(Bq / kg・dry soil)	
		北緯 North Latitude	東経 East Longitude			Cs-134	Cs-137
【K-T1】	2013/8/21	35° 35.1969'	139° 52.8853'	12.0	M	15	36
【K-T2】	2013/8/21	35° 30.2054'	139° 50.6039'	24.0	M	6.0	16

※1 【 】内の番号は、図の測点番号に対応。  
※1 The character enclosed in parentheses indicates Sampling Point in figure.  
※2 M : 泥 Mud

\* 原子力規制委員会の依頼により、(公財)日本分析センターが試料を採取し、分析。  
\* The samples were collected and analyzed by Japan Chemical Analysis Center on the request of Nuclear Regulation Authority (NRA).


(参考)  
海上保安庁が公表した「放射能調査報告書」- 平成21年及び22年調査結果 -によると、東京湾内の地点【K-T1】において平成21年、平成22年に採取した海底土中のCs-137濃度は、それぞれ4.0Bq/kg・乾土、3.5 Bq/kg・乾土。  
(Reference)  
Reports of radioactivity surveys which were published by Japan Coast Guard in 2009 and 2010 show that the concentrations of Cs-137 in the marine soil sampled at 【K-T1】 in 2009 and 2010 were 4.0 Bq/kg・dry soil and 3.5 Bq/kg・dry soil, respectively.

# 東京湾における海域モニタリング結果(海底土)

## Readings of Sea Area Monitoring at Tokyo Bay (Marine Soil)

試料採取日: 平成25年8月21日  
(Sampling Date: Aug 21, 2013)

公表日: 平成25年10月22日  
(Published: Oct 22, 2013)  
原子力規制委員会  
Nuclear Regulation Authority (NRA)



\* 原子力規制委員会の依頼により、(公財)日本分析センターが試料を採取し、分析。

\* The samples were collected and analyzed by Japan Chemical Analysis Center on the request of Nuclear Regulation Authority (NRA).

(参考)

海上保安庁が公表した「放射能調査報告書」- 平成21年及び22年調査結果 -によると、東京湾内の地点【K-T1】において平成21年、平成22年に採取した海底土中のCs-137濃度は、それぞれ4.0Bq/kg・乾土、3.5 Bq/kg・乾土。

(Reference)

Reports of radioactivity surveys which were published by Japan Coast Guard in 2009 and 2010 show that the concentrations of Cs-137 in the marine soil sampled at 【K-T1】 in 2009 and 2010 were 4.0 Bq/kg・dry soil and 3.5 Bq/kg・dry soil, respectively.